






















MANUALE D'USO - USER MANUAL



EASY

SISTEMA PER AEROSOLTERAPIA - AEROSOL THERAPY SYSTEM

FIG. A



INSTRUÇÕES PARA O USO
O aparelho deve ser utilizado antes de cada utilização a fim de detectar anomalias de funcionamento e/ou danos decorrentes do transporte ou do armazenamento.

• Os acessórios devem ser utilizados para um único paciente; não é aconselhável o uso para mais de um paciente.
• Durante a inalação, nenhuma posição estável é requerida, mas a respiração é mais rápida, para evitar a compressão das vias respiratórias que pode comprometer a eficiência da inalação.

• Após ter removido o aparelho da embalagem, controle se existem danos evidentes; preste atenção especial a trincas no plástico que podem deixar alguns componentes expostos.

• Verifique a integridade dos acessórios.

• Antes de utilizar o aparelho, efete as operações de desinfecção segundo as descrições do capítulo «LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS ACESSÓRIOS».

• Tenha a quantificação de oxigénio antes de iniciar a inalação e certifique-se de que é alta para elas.

• Assegure-se de que o dispositivo de medição indica o nível de oxigénio que é necessário para a inalação.

• Assegure-se de que o dispositivo de medição esteja inserido corretamente no ponto de condução de ar na parte interna do nebulizador (Fig. C).

• Tenha a quantificação de oxigénio antes de iniciar a inalação e certifique-se de que é alta para elas.

• Conecte uma extremidade do tubo de ar à saída no fundo do nebulizador (Fig. F) e a outra extremidade da saída do ar (Fig. G) no aparelho.

• Para utilizar a máscara, insira-a diretamente no nebulizador (Fig. H).

• Para iniciar a inalação, certifique-se de que a alimentação de rede corresponde aos dados da placa do aparelho.

• Para iniciar o tratamento, coloque o interruptor I/O no posição «ON».

ATENÇÃO! O aparelho é para uso intermitente, 20 min LIGADO/40 min DESLIGADO.

• Aperte o interruptor I/O para iniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para parar o tratamento.

• Aperte o interruptor I/O para reiniciar o tratamento.